

Penvir (fanciclovir): APRESENTAÇÕES: Comprimidos revestidos de 125mg; Embalagem contendo 4 ou 10 comprimidos revestidos. Comprimidos revestidos de 500mg; Embalagem contendo 14 ou 21 comprimidos revestidos. Uso oral. Uso adulto. **INDICAÇÕES:** **Penvir** é indicado para o tratamento de *herpes zoster* agudo; infecções por *herpes simplex*: tratamento ou supressão do herpes genital recorrente ou mucocutâneas recorrentes em pacientes imunocompetentes. **CONTRAINDICAÇÕES:** **Penvir é contraindicado a pacientes que apresentem hipersensibilidade ao fanciclovir e aos componentes da formulação e nos casos de hipersensibilidade conhecida a penciclovir.** Categoria de risco B. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:** Deve-se ter uma atenção especial a pacientes com função renal comprometida, quando for necessário ajustar a dose. Os pacientes devem evitar relações sexuais quando os sintomas estiverem agudos ou quando os sintomas estiverem presentes, mesmo se o tratamento com um antivirótico já tiver sido iniciado. **Penvir** não deve ser usado durante a gravidez ou em mulheres que estejam amamentando, a menos que se avalie risco/benefício. O uso em crianças não é recomendado. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** **Nenhuma interação farmacocinética clinicamente significativa foi identificada. Probenecida e outras drogas podem afetar os níveis plasmáticos de penciclovir.** **REAÇÕES ADVERSAS:** as reações mais comuns são os transtornos de cefaleia e, as reações incomuns são: diarreia, tontura, fadiga, flatulência, irritação gastrointestinal, náuseas, parestesia, prurido de pele e rash. **POSOLOGIA:** **Penvir** deve ser administrado por via oral com ou sem alimento. *Herpes zoster:* A dose recomendada é de 500mg a cada 8 horas durante 7 dias. *Herpes simplex:* **Primeiro episódio de infecções por herpes genital: 250mg três vezes ao dia por cinco dias.** Herpes genital recorrente: A dose recomendada é de 125mg duas vezes ao dia durante 5 dias. Supressão do herpes genital recorrente: A dose recomendada é de 250mg duas vezes ao dia durante 1 ano. Pacientes infectados pelo HIV: A dose recomendada é de 500mg duas vezes ao dia durante 7 dias para o tratamento de infecções orolabial recorrente ou *Herpes simplex* genital. Em pacientes com comprometimento moderado a severo da função renal, a frequência de administração deve ser diminuída proporcionalmente ao grau de comprometimento avaliado pelo clearance de creatinina. As seguintes alterações são recomendadas: *Herpes Zoster:* Clearance de creatinina > 60mL/min recomenda-se 500mg a cada 8 horas. Clearance de creatinina 40 a 59mL/min recomenda-se 500mg a cada 12 horas. Clearance de creatinina 20 a 39mL/min recomenda-se 500mg a cada 24 horas. Clearance de creatinina < 20mL/min recomenda-se 250mg a cada 24 horas. Casos de hemodiálise recomenda-se 500mg após cada diálise. *Herpes genital recorrente:* Clearance de creatinina ≥ 40mL/min recomenda-se 125mg a cada 12 horas. Clearance de creatinina 20 a 39mL/min recomenda-se 125 mg a cada 24 horas. Clearance de creatinina < 20mL/min recomenda-se 125mg a cada 24 horas. Casos de hemodiálise recomenda-se 125mg após cada diálise. *Supressão do Herpes genital recorrente:* Clearance de creatinina ≥ 40mL/min recomenda-se 250mg a cada 12 horas. Clearance de creatinina 20 a 39mL/min recomenda-se 125mg a cada 12 horas. Clearance de creatinina < 20mL/min recomenda-se 125mg a cada 24 horas. Casos de hemodiálise recomenda-se 125mg após cada diálise. *Herpes genital ou orolabial recorrente em pacientes infectados pelo HIV:* Clearance de creatinina ≥ 40mL/min recomenda-se 500mg a cada 12 horas. Clearance de creatinina 20 a 39mL/min recomenda-se 500mg a cada 24 horas. Clearance de creatinina < 20mL/min recomenda-se 250mg a cada 24 horas. Casos de hemodiálise recomenda-se 250mg após cada diálise. **Registro MS nº 1.3569.0607. Detentor: EMS SIGMA PHARMA LTDA. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO". VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.**